



Euphon®

Sirop

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

• IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Nom du médicament : EUPHON sirop

Composition

- Les substances actives sont :

Codéine 0,100 g
Extrait sec aqueux sur maltodextrine d'erysimum officinale 0,300 g
(maltodextrine incluse dans la masse d'extrait: 0,090 à 0,120 g)
Pour 100 ml de sirop.

- Les autres composants sont : acide citrique monohydraté, rouge cochenille A, arôme naturel framboise, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, alcool, solution de saccharose, eau purifiée.

Titre alcoolique : 2,7 % v/v.

1 cuillère à soupe ou godet gradué à 15 ml contient : 15 mg de codéine
10,28 g de saccharose
320 mg d'alcool absolu

1 godet gradué à 10 ml contient : 10 mg de codéine
6,85 g de saccharose
213 mg d'alcool absolu

1 godet gradué à 5 ml contient : 5 mg de codéine
3,43 g de saccharose
107 mg d'alcool absolu

Titulaire / Fabricant

Laboratoires MAYOLY SPINDLER

6, avenue de l'Europe - B.P. 51 - 78401 CHATOU CEDEX - FRANCE

• QU'EST-CE QUE EUPHON, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un sirop. Flacon de 150 ml ou 300 ml avec godet.

Ce médicament est un antitussif. Il est préconisé pour calmer les toux sèches, les toux d'irritation.

• QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE EUPHON, sirop ?

Ne prenez jamais EUPHON, sirop dans les cas suivants

- Enfant de moins de 30 mois,
- Insuffisance respiratoire,
- Toux de l'asthmatique,
- Allergie connue à l'un des constituants notamment parahydroxybenzoates de méthyle et de propyle ou au rouge cochenille A.

Mises en garde spéciales

- Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.
- Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, d'expectoration (rejet, en crachant, des sécrétions bronchiques), de fièvre, demandez l'avis de votre médecin.
- En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches et des poumons s'accompagnant d'expectoration, un avis médical est indispensable.

Attention ! Le titre alcoolique de ce sirop est de 2,7 % (v/v) soit 320 mg d'alcool pour une cuillère à soupe de sirop (15 ml) ou un godet gradué à 15 ml, 213 mg pour un godet gradué à 10 ml, 107 mg pour un godet gradué à 5 ml.

En raison de la présence de rouge cochenille A, ce médicament peut provoquer des réactions allergiques, voire de l'asthme, en particulier chez les personnes allergiques à l'aspirine.

Précautions particulières d'emploi

- Sujets âgés, insuffisants hépatiques (sujets atteints de maladies graves du foie).
- Les doses, en début de traitement seront diminuées de moitié et pourront ensuite être augmentées en fonction de l'effet et de la tolérance.
- La prise de boissons alcoolisées durant ce traitement est déconseillée.
- Chez le diabétique: tenir compte de la teneur en sucre: 10,28 g par cuillère à soupe.

En raison de la présence d'alcool, prévenez votre médecin en cas de maladie du foie, d'épilepsie, de grossesse et d'allaitement.

Grossesse et Allaitement

L'usage de ce médicament est déconseillé en cas de grossesse ou d'allaitement.

Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Attention, cette spécialité contient une substance pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopage.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est appelée notamment chez les conducteurs de véhicules (automobiles, deux roues) et les utilisateurs de machines sur les possibilités de somnolence attachées à l'usage de ce médicament.

Ce phénomène s'atténue après plusieurs prises ; il peut être préférable de commencer ce traitement le soir.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées.

Excipients à effet notoire

Alcool, saccharose, rouge cochenille A (E124), parahydroxybenzoates de méthyle (E218) et de propyle (E216).

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament contient un antitussif, la codéine. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les posologies maximales conseillées (voir rubrique posologie).

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

• COMMENT PRENDRE EUPHON, sirop ?

Ce médicament n'est à administrer qu'aux horaires où survient la toux. Par exemple pour une toux ne survenant que le soir, une prise unique peut suffire. En l'absence d'efficacité, ne pas augmenter les doses au-delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif mais consultez votre médecin.

La posologie usuelle est de :

- **Adulte** : 1 à 2 cuillères à soupe ou mesures graduées (15 ml) de sirop par prise à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin sans dépasser 4 prises par jour.

- **Enfant de plus de 12 ans** :

Utiliser un godet gradué.

Enfant de 40 à 50 kg (environ 12 à 15 ans) : 1 mesure graduée à 15 ml ou 1 cuillère à soupe par prise, à renouveler au bout de 6 heures en cas de besoin, sans dépasser 4 prises par jour.

Voie orale.

Le traitement doit être court (quelques jours).

Si vous avez pris plus de EUPHON, sirop que vous n'auriez dû : demandez l'avis de votre médecin.

Si vous oubliez de prendre EUPHON, sirop : reprendre le traitement conformément à la prescription.

Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par EUPHON, sirop est arrêté : aucun en dehors de la réapparition des troubles ayant motivé la prescription.

• QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, EUPHON, sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- constipation,
- somnolence,
- vertiges,
- nausées, vomissements,
- gêne respiratoire,
- réactions cutanées allergiques.

Ceci ne doit pas faire interrompre le traitement. Il faut en avertir votre médecin afin qu'il adapte la posologie.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

• COMMENT CONSERVER EUPHON, sirop ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Le flacon doit être utilisé dans les 30 jours après ouverture.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

• DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : juin 2006.



Laboratoires MAYOLY SPINDLER

6, avenue de l'Europe - B.P. 51 - 78401 CHATOU CEDEX - FRANCE

Information médicale : +33 (0) 1 34 80 72 60