

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

*Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.*

*Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.*

*Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.*

- Les substances actives sont le chlorhydrate de pyridoxine (0,02 g), l'acide L-glutamique (0,38 g), le L-biaspartate mixte de magnésium et de potassium dihydraté (0,10 g), la glycine (0,24 g) pour 100 ml.

- Les autres composants sont le chlorure de benzalkonium, la L-arginine, le phosphate monosodique dihydraté, le phosphate disodique dodécahydraté, l'eau purifiée.

## TITULAIRE ET EXPLOITANT

Laboratoire CHAUVIN  
416, rue Samuel Morse  
34000 MONTPELLIER - France

## FABRICANT

Laboratoire CHAUVIN  
Z.I. Ripotier Haut  
07200 AUBENAS - France

## QU'EST CE QUE Catarstat, collyre en solution ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un collyre.

Il est préconisé dans les opacités du cristallin (cataracte).

## INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'UTILISER Catarstat, collyre en solution

### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (contre-indications) :

Ce médicament ne doit pas être utilisé :

- en cas d'hypersensibilité au médicament ou à l'un des constituants du collyre.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### Prendre des précautions particulières avec Catarstat, collyre en solution :

#### Précautions d'emploi

- Le collyre ne doit pas être employé en injection péri ou intra-oculaire, ni avalé.
- En cas de manifestations allergiques, le traitement doit être interrompu.
- En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, le port des lentilles de contact est déconseillé pendant le traitement.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, instiller les collyres à 15 minutes d'intervalle.

#### Grossesse et allaitement :

*Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.*

#### Excipients à effet notable :

Chlorure de benzalkonium.

#### Utilisation d'autres médicaments :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### COMMENT UTILISER Catarstat, collyre en solution ?

En moyenne 2 gouttes dans chaque œil, 2 à 3 fois par jour.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit dans une situation précise :

- il peut ne pas être adapté à un autre cas,
- ne pas le conseiller à une autre personne.

*Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.*

Voie ophtalmique.

- Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.
- Eviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.
- Instiller une goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil malade en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
- Reboucher le flacon après usage.

*Si vous avez l'impression que l'effet de Catarstat, collyre en solution, est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.*

#### Si vous avez utilisé plus de Catarstat, collyre en solution que vous n'auriez dû :

*Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.*

#### Si vous oubliez de prendre Catarstat, collyre en solution :

*Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre, mais poursuivez simplement votre traitement.*

#### QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

*Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :*

Symptômes d'irritation oculaire non graves, à type de sensation de brûlure, larmolement, démangeaisons, survenus après l'instillation.

*Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.*

#### COMMENT CONSERVER Catarstat, collyre en solution ?

*Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.*

A conserver à une température ne dépassant pas plus de 25°C.

Conserver 15 jours après première ouverture.

*Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur.*

*La dernière date à laquelle la notice a été approuvée : Juin 2007.*